Toestemmingsformulier voor Microneedlingbehandeling

Ik geef hierbij toestemming _____ om Microneedle Therapy (Collageen Inductie Therapie) uit te voeren.

Wat kunt u verwachten:

- Afhankelijk van het gebied van uw gezicht of lichaam dat wordt behandeld en het soort apparatuur dat wordt gebruikt (dwz. naaldlengte), is de procedure goed te verdragen. In sommige gevallen vrijwel pijnloos of u voelt een prikkeling.
- Uw huid kan, afhankelijk van de intensiteit van de behandeling (dwz. naaldlengte en het aantal keer dat de roller over het behandelgebied gaat), geïrriteerd zijn waardoor roodheid, kleine bloedingen en blauwe plekjes kunnen ontstaan. Uw huid kan na de behandeling ook warm, strak en jeukend aanvoelen voor een korte tijd. Dit gevoel zal verdwijnen binnen 12 - 48 uur.
- Make-up kan pas de dag na de behandeling worden aangebracht.

Bijwerkingen

- Bijwerkingen of risico's zijn minimaal met dit soort behandelingen en omvatten doorgaans irritaties zoals: kleine schilferingen, droge huid en in zeldzame gevallen korstjes.
- Als u ooit een koortslip heeft gehad in het verleden, dan is het mogelijk dat door deze behandeling weer een koortslip kan ontstaan.
- Tijdelijke roodheid gedurende 3-4 dagen.
- Sproetjes kunnen verlichten en / of tijdelijk of permanent verdwijnen in de gebieden die zijn behandeld.
- Een infectie is zeer ongebruikelijk. Echter, virale, bacteriële en schimmelinfecties kunnen optreden wanneer de integriteit van de huid is aangetast. Mocht een infectie optreden, dan moet u een huisarts raadplegen.
- Hyperpigmentatie is zeer zeldzaam na een micro-needlingbehandeling. Echter, als u de instructies van de nabehandeling niet volgt, dan kan er een risico zijn voor de hyperpigmentatie. U moet blootstelling aan de zon gedurende 1 tot 2 weken voorkomen na een micro-needlingbehandeling. Daarnaast is het aan te

raden om een dagelijkse SPF 30 gezichtscrème te dragen. Tot slot, vermijd een peeling op de huid tijdens de nabehandelingperiode.

- Littekens kunnen worden voorkomen in zowel de huid als in diepere weefsels. In zeldzame gevallen kunnen keloïden of hypertrofische littekens ontstaan, voornamelijk als je hiervoor gevoelig bent. Littekens hebben een andere kleur dan de omringende huid. Aanvullende behandelingen zijn nodig om littekens te behandelen. Permanente littekens (minder dan 1%) is zeer zeldzaam.
- De behandeling kan een licht branderig, krassend en geïrriteerd gevoel geven. Dit is tijdelijk en verdwijnt binnen enkele uren na de behandeling. Een plotselinge terugkeer van roodheid of pijn is een teken van een infectie en dan moet u onmiddellijk een huisarts raadplegen.
- Aanhoudende roodheid, jeuk en lichte zwellingen horen bij het genezingsproces. Deze symptomen duren in de meeste gevallen niet langer dan 24 uur.
- De micro-needling is uitgevoerd met een bovenstuk dat bestaat uit steriele naalden waardoor een allergische reactie vrijwel onmogelijk is. Maar er bestaat wel een mogelijkheid bij de verscheidenheid aan producten die op het gezicht kunnen worden gebruikt, in combinatie met de micro needling behandelingen, dat een allergie kan optreden. Bovendien kan het ertoe leiden dat u overgevoelig bent voor producten die gebruikt worden op het gezicht aangezien de micro-needling behandeling de penetratie verhoogt van producten die op de huid worden aangebracht. Als een allergische reactie zich voordoet dan moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
- Het is belangrijk dat uw verwachtingen van de micro-needling behandeling realistisch zijn. Aanvullende procedures zijn wellicht nodig zijn om het gewenste effect te bereiken.
- Hoewel het zeer zeldzaam is bij micro-needling, is een tegenvallend resultaat mogelijk. Micro-needling behandeling kan ongewenste gevolgen hebben zoals: huidvervelling, littekens, permanente pigmentatie en / of andere ongewenste huidafwijkingen.

Ik begrijp de volgende contra indicaties die hieronder zijn vermeld en ik zal de specialiste op de hoogte brengen als een van de volgende punten op mij van toepassing is:

- ✓ Huidige infecties – viraal, schimmel, bacterieel
- ✓ Huidkanker
- ✓ Verhoogde laesies (moedervlekken, wratten, etc.)
- ✓ Acne
- ✓ Patiënten waarvan het immuunsysteem wordt onderdrukt
- ✓ Huidgerelateerde auto-immune ziekten
- ✓ Patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken (NSAIDS, ASA, Cumarine)
- ✓ Zwangerschap en borstvoeding
- ✓ Recente intensieve behandelingen zoals chemische peeling, laser, botox, permanent fillers
- ✓ Eetstoornissen, psychische stoornissen
- ✓ Rosacea / Eczeem / Psoriasis / Dermatitis
- ✓ Diabetes
- ✓ Actinische (zonne) keratose
- ✓ Keloïden en hypertrofische littekens
- ✓ Recent gebruik van pijnbestrijding via de huid
- ✓ Allergisch voor roestvrij staal
- ✓ Hormoonsubstitutietherapie
- ✓ Bloedverdunnende medicijnen
- ✓ Hart en vaatziekte/-afwijkingen
- ✓ Chemotherapie of bestraling
- ✓ Sclerodermie
- ✓ Verbrand of overmatige blootstelling aan de zon
- ✓ Tattoos
- ✓ Teleangiëctasie
- ✓ Woekering van bloedvaten (hemongiomen)

Ik ben geïnformeerd over de voordelen en risico's van deze procedure en ik aanvaard deze voordelen en risico's. Ik ben ook bewust dat ik het risico aanvaard van zeldzame en onvoorziene complicaties die niet zijn besproken en die kunnen voortvloeien uit deze behandeling. Ik heb de gelegenheid gehad om vragen te stellen en deze zijn naar tevredenheid beantwoord.

_____	_____	_____
Handtekening cliënt	Naam	Datum
_____	_____	_____
Handtekening behandelaar	Naam	Datum

Voorzorg

- Vermijd vitamine E, visoliën en ginko biloba een week voor de behandeling.
- Vermijd anti-histamine en ontstekingsremmers een week voorafgaand aan de behandeling. Deze zullen de effecten van de procedure of behandeling teniet doen. Histamine in het lichaam en ontstekingsreacties zijn nodig na de procedure.
- Stop met retinoïde een week voorafgaand aan de behandeling.
- Als u Accutane® gebruikt is het verplicht om 3 maanden te wachten na het stoppen van de medicatie voorafgaand aan de behandeling.
- Vermeld aan de behandelaar als u ooit een diagnose heeft gehad voor herpes simplex virus (HSV) – u kunt een preventieve behandeling nodig hebben.

Wat kunt u verwachten na de behandeling:

• Er zullen direct kleine bloedingen ontstaan en zullen verdwijnen binnen 10 minuten.

• Irritatie na de behandeling zoals roodheid en zwelling gedurende 1-2 dagen.

• Minimale afschilfering en schilfertjes kunnen ontstaan na een paar dagen. Niet trekken aan de losse huid.

• Raadpleeg een huisarts als u het volgende ervaart: overmatige roodheid, zwelling, pijn of drainage dat mogelijk wijst op een infectie.

Nazorg

• De eerste 72 uur na de procedure zijn de meest kritische

• Vermijd directe zon en warmte. Let op eenvoudige dagelijkse bezigheden, zoals tuinieren, koken op een heet fornuis voor een lange tijdsperiode of het zitten naast een open vuurtje of open haard, etc.

• Stop met het gebruik van Alpha-Hydroxy producten. U kunt het hervatten zodra de huid niet langer schilfert en peelt

• Gebruik hydraterende en herstellende producten. Microneedling behandeling kan tijdelijk vochtverlies uit transepidermale huidlaag veroorzaken. Producten die rijk zijn aan rustgevende en helende ingrediënten zijn het beste om nieuwe gezonde celgroei te stimuleren.

• Gebruik fysieke anti-zonnebrandcrème. Zonnebrandproducten moeten worden toegepast elke 30 tot 90 minuten. Ga niet naar buiten zonder bescherming tegen de zon (zelfs op een bewolkte dag).

• Niet krabben of een peeling gebruiken

• Reduceer beweging in de eerste week

• Drink veel water